

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-4-66 500462

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,  
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.  
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement Annuel

15, F 00

- Supplément n° 2 au Bulletin n° 67

1966 - 11

## - A V E R T I S S E M E N T S -

### ARBRES FRUITIERS

#### • Tavelures du poirier et du pommier :

Bien que la période des plus fortes projections soit passée, celles qui sont susceptibles de se produire seront encore importantes, étant donné l'accroissement rapide de la végétation et l'élévation graduelle de la température. En outre les sorties de taches (commencées le 12 Avril) se produisent à peu près journellement et se poursuivront, au moins, jusque vers la fin de la première semaine de Mai.

Il y a donc intérêt à effectuer un nouveau traitement dès à présent.

#### • Hyplocampe des pommes :

Dans les vergers habituellement intéressés (petits vergers en général) placer un traitement dès réception sur les variétés déflorées ou au cours de défloraison. Employer un produit à base soit de H.C.H., soit de Lindane, soit de Parathion.

### V I G N E

#### • Black-rot :

Les projections de germes hivernants deviennent très nombreuses au cours des pluies. Seulement, dans les vignes atteintes en 1965, effectuer une nouvelle application.

#### • Mildiou :

L'hiver doux et humide a été favorable à une très bonne conservation des oeufs d'hiver et les taux de germination observés sont élevés. On peut donc craindre l'établissement de foyers précoces. Nous conseillons donc de supprimer soigneusement les repousses de la base des ceps et de faciliter au mieux l'écoulement des eaux de pluie.

Dans le cas où l'on trouverait une feuille présumée atteinte, la faire parvenir à la Station.

## - I N F O R M A T I O N S -

### ARBRES FRUITIERS

#### • Lyda du pêcher :

Des pontes précoces ont été déposées sur pêcher et prunier dans certains vergers et les jeunes larves ont commencé leurs dégâts. Les détruire en appliquant

.../...

92

un produit à base soit de D.D.T., soit de Parathion, soit d'Azinphos.

CULTURE LEGUMIERE

- Bettrytis sur fraisier (pourriture grise) et maladies du feuillage :

Renouveler le traitement conseillé dans le précédent bulletin, notamment sur les variétés très sensibles.

- Charbon sur Oignon :

On a constaté cette année la disparition de nombreuses plantes, peu après la levée. Il s'agissait très souvent d'une attaque par le charbon de l'oignon (*Ureocystis Cepulae*).

Nous rappelons qu'une bonne protection peut être assurée par le traitement des graines, à sec, avant le semis avec un produit à base de Thirame (ou T.M.T.D.) à la dose de 56 grammes de matière active par Kilogramme de semence.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles

J. BESSON - E. JOLY

TOULOUSE, le 27 AVRIL 1966

L'INSPECTEUR DE LA PROTECTION  
DES VEGETAUX

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Midi

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX